

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

Bulletin N°2  
12 Janvier 1982

DLP 21-12-82085785  
BULLETIN  
TECHNIQUE  
DES  
STATIONS  
D'AVERTISSEMENTS  
AGRICOLES

PUBLICATION PERIODIQUE

EDITION DE LA STATION PROVENCE - ALPES - COTE D'AZUR et CORSE

(ALPES de HAUTE PROVENCE, HAUTES-ALPES, ALPES MARITIMES, BOUCHES-DU-RHON, HAUTE-CORSE, CORSE SUD, VAR, VAUCLUSE, SUD de l'ARDECHE et de la DROME)

SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX

Siège de la circonscription : 24, Rue Edouard Delanglade - 13006 MARSEILLE

Station d'Alertes : Quartier Cantarel - MONTFAVET Adresse Postale : B.P. 95 84140 MONTFAVET - TELEPHONE : (90) 88.21.83  
ABONNEMENT ANNUEL : 85 F REGISSEUR DE RECETTES DE LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'AGRICULTURE AVIGNON CCP MARSEILLE 9660 74 V

## ARBRES FRUITIERS



PSYLLE DU POIRIER - A cette date le seuil de 50% de femelles prêtes à pondre est atteint.

Un traitement est donc à prévoir dès le deuxième jour consécutif au cours duquel la température maximum atteindra ou dépassera 10°C.

Ajouter à la liste des pyrèthrinoides cités contre le Psylle, une autre spécialité à base de perméthrine : Ambush.

PUCERON VERT (*Myzus persicae*) sur pêchers et amandiers - Pour éviter ou au moins retarder les traitements en végétation, il est utile d'intervenir contre ce ravageur par un traitement de prédébouillage destiné à détruire les oeufs et les premières larves.

Ceux-ci se situant à l'aisselle des bourgeons, la pulvérisation devra donc être très soigneuse pour les atteindre partout où ils se trouvent (extrémités des rameaux entre autres). Elle sera effectuée par temps calme et ensoleillé ainsi qu'en l'absence d'humidité.

On utilisera avant débouillage des colorants nitrés (D.N.O.C.) à raison de 600 g de M.A./hl, soit environ 1 l. de produit commercial par hectolitre.

On prendra toutes les précautions utiles à proximité des cultures légumières ou des arbres à feuilles persistantes (cyprès, oliviers, etc ...).

Ce traitement pourra être associé si nécessaire à celui préconisé ci-dessous contre la CLOQUE jusqu'au stade B. Si ce traitement anti-pucerons ne peut être effectué avant ce stade, on interviendra au stade "bouton rose" (au plus tard) avec du lindane (nombreuses spécialités) à raison de 30 g de M.A./hl.

CLOQUE DU PECHEUR et DE L'AMANDIER - Sur les variétés sensibles à cette maladie et dans le cas où le traitement au cuivre (500 g de cuivre métal) recommandé à l'automne n'a pu être appliqué, on pourra l'effectuer jusqu'au gonflement des bourgeons et à plus de 10 jours de la taille.

A partir du stade B, les fongicides de synthèse suivants seront seuls employés :

captafol (Difosan, Orthodifolatan) 120 g M.A./hl.

captane (nombreuses spécialités) 250 g M.A./hl.

ferbame (Ferbamate, Sépifer) 175 g M.A./hl (incompatible avec produits cupriques)

thirame (nombreuses spécialités) 175 g M.A./hl.

zirame (nombreuses spécialités) 175 g M.A./hl.

MONILIA DES ARBRES FRUITIERS A NOYAU - On mettra en oeuvre les mesures prophylactiques déjà conseillées à savoir : suppression des rameaux morts ou dépérissants et des fruits momifiés ainsi que le curetage des chancres et leur désinfection (peinture ou pâte fongicide).

Dans le cas d'arbres âgés ou fortement attaqués l'année précédente un traitement cuprique à raison de 500 g de cuivre métal par hectolitre est conseillé jusqu'au gonflement des bourgeons si cette application n'a pas déjà été effectuée.

TRAITEMENT D'HIVER DES ARBRES FRUITIERS - Dans la liste des spécialités à base d'huile d'anthracène donnée dans notre précédent Bulletin supprimer la Véraline 3 uniquement homologuée pour le traitement d'hiver de la vigne.

LE CHEF DE LA CIRCONSCRIPTION PHYTOSANITAIRE  
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR & CORSE  
G. TOUZAA

7159